



ENERGIE



**TRAVAIL OCCASIONNEL
À ACTIF**



GRANULÉ



**COMPLÉMENTAIRE
DE FOURRAGES**



**MATIÈRES
PREMIÈRES
locales**



Sécurité digestive (amidon raisonné)



Apports d'oligo-éléments sous forme biodisponible



Enrichi en fibres: taux de cellulose augmenté



Choix de sources énergétiques équilibrées pour une énergie contrôlée



Pour des rations déficitaires en fourrages

Disponible
en **big bag** et **vrac**

Code produit :
big bag : 5723903B10
vrac : 5723903V00

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur
cheval-alimentation.com



Scannez-ici !



VOTRE CHEVAL, NOTRE EXIGENCE.

ENERGIE

Aliment granulé
complémentaire de
fourrages

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute.....	12.50 %
Matière grasse brute	3.50 %
Cellulose brute	17.50 %
Cendres brutes	6.60 %
Sodium	0.30 %
Phosphore	0.46%
Calcium	1 %

VITAMINES :

Vitamine A	8000 UI/kg
Vitamine D3	1200 UI/kg
Vitamine E	160 UI/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS :

Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté)	19.2 mg/kg
Cuivre (chélate de cuivre (II) de glycine hydraté).....	5.0 mg/kg
Fer (sulfate de fer monohydraté)	58 mg/kg
Fer (chélate de fer (II) de glycine hydraté).....	14 mg/kg
Manganèse (oxyde de manganèse).....	32 mg/kg
Manganèse (chélate de manganèse de glycine).....	8 mg/kg
Zinc (oxyde de zinc).....	57 mg/kg
Zinc (chélate de zinc de glycine hydraté).....	14 mg/kg
Iode (iodure de potassium)	0.38 mg/kg
Sélénium (sélénite de sodium)	0.12 mg/kg
Sélinométhionine	0.12 mg/kg

UFC : 0.75 **MADC :** 93 g/kg **LYSINE :** 0.55 %

Ingrédients : se référer sur les sacs ou bons de livraison

PROGRAMMES ALIMENTAIRES

Poids du cheval	Quantité à distribuer par jour
300 kg	2,6 à 5,2 kg (4 à 8 L)
400 kg	3,25 à 5,85 kg (5 à 9 L)
500 kg	3,9 à 6,5 kg (6 à 10 L)
600 kg	4,55 à 7,15 kg (7 à 11 L)

Ces rations sont préconisées sur la base d'un apport de foin minimum d'1 kg pour 100 kg de poids vif sur litière paille. Elles sont à moduler en fonction de la qualité et la quantité de fourrages disponibles ainsi que de l'état général et le niveau d'activité du cheval. En cas de litière artificielle, augmentez les apports en foin de 2 à 3 kg supplémentaires par jour. La distribution du nouvel aliment devra s'effectuer de façon progressive grâce à une transition avec le précédent aliment sur 8-10 jours minimum. Rations en 2 ou 3 repas par jour avec eau pure et tempérée à volonté.

