



PERFORMANCE



**TRAVAIL SOUTENU
À INTENSIF**



GRANULÉ



**COMPLÉMENTAIRE
DE FOURRAGES**



**MATIÈRES
PREMIÈRES
locales**



Sécurité digestive (amidon raisonné)



Bien-être du microbiote digestif et équilibre de la flore



Apports d'oligo-éléments sous forme biodisponible



L-Carnitine: favorise l'utilisation des sources d'énergie sous forme de matières grasses végétales



Balance Cations-Anions élevée pour compenser les pertes générées par la sueur : BACA 200 meq/kg



Disponible
en **sac**, **vrac**
et **big bag**

Code produit :
sac : 5781803S25 / palette de 36 sacs
vrac : 5781803V00
big bag : 5781803B10

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur

cheval-alimentation.com



Scannez-ici !

EAN : 3280820002683



VOTRE CHEVAL, NOTRE EXIGENCE.

PERFORMANCE

Aliment granulé complémentaire de fourrages

CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute	12.80 %
Matière grasse brute	2.60 %
Cellulose brute	10.50 %
Cendres brutes	7.10 %
Sodium	0.44 %
Phosphore	0.51 %
Calcium	1 %

VITAMINES :

Vitamine A	11000 UI/kg
Vitamine D3	1650 UI/kg
Vitamine E	220 UI/kg

OLIGO-ÉLÉMENTS :

Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté)	26.4 mg/kg
Cuivre (chélate de cuivre (II) de glycine hydraté)	7 mg/kg
Fer (sulfate de fer monohydraté)	79 mg/kg
Fer (chélate de fer (II) de glycine hydraté)	20 mg/kg
Manganèse (oxyde de manganèse)	44 mg/kg
Manganèse (chélate de manganèse de glycine)	11 mg/kg
Zinc (oxyde de zinc)	79 mg/kg
Zinc (chélate de zinc de glycine hydraté)	20 mg/kg
Iode (iodure de potassium)	0.53 mg/kg
Sélénium (sélénite de sodium)	0.17 mg/kg
Sélenométhionine	0.17 mg/kg

UFC : 0.82 **MADC :** 101 g/kg **LYSINE :** 0.48 %

Ingrédients : se référer sur les sacs ou bons de livraison

PROGRAMMES ALIMENTAIRES

Poids du cheval	Quantité à distribuer par jour
300 kg	2,6 à 3,9 kg (4 à 6 L)
400 kg	3,25 à 4,55 kg (5 à 7 L)
500 kg	3,9 à 5,85 kg (6 à 9 L)
600 kg	5,2 à 6,5 kg (8 à 10 L)



Ces rations sont préconisées sur la base d'un apport de foin minimum d'1 kg pour 100 kg de poids vif sur litière paille. Elles sont à moduler en fonction de la qualité et la quantité de fourrages disponibles ainsi que de l'état général et le niveau d'activité du cheval. En cas de litière artificielle, augmentez les apports en foin de 2 à 3 kg supplémentaires par jour. La distribution du nouvel aliment devra s'effectuer de façon progressive grâce à une transition avec le précédent aliment sur 8-10 jours minimum. Rations en 2 ou 3 repas par jour avec eau pure et tempérée à volonté.