



# TEAM

VOTRE **CHEVAL**, NOTRE **EXIGENCE**.

## FLOC



**FLOCONNÉ**



**COMPLÉMENTAIRE  
DE FOURRAGES**



**TRAVAIL  
OCCASIONNEL  
À ACTIF**



**MATIÈRES  
PREMIÈRES  
locales**



Sécurité digestive (amidon raisonné < 26%)



Mélange de céréales cuites à la vapeur pour une meilleure assimilation



Apports d'oligo-éléments et vitamines



Disponible  
en **sac** de 20 kg

Code produit : 5720811S20  
Code EAN : 3280820002294

Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur

[cheval-alimentation.com](http://cheval-alimentation.com)



Scannez-ici !



# FLOC

Aliment floconné complémentaire de fourrages

## CONSTITUANTS ANALYTIQUES :

Protéine brute.....	12.70 %
Matière grasse brute .....	3.50 %
Cellulose brute .....	11.30 %
Cendres brutes .....	9.40 %
Sodium .....	0.46 %
Calcium.....	1.50 %
Phosphore.....	0.50 %

## ADDITIFS :

### VITAMINES :

Vitamine A (3a672a) .....	10000 UI/kg
Vitamine D3 (3a671) .....	1200 UI/kg
Vitamine E (3a700i) .....	100 UI/kg

### OLIGO-ÉLÉMENTS :

Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté 3b405) .....	20 mg/kg
Manganèse (oxyde de manganèse (II) 3b502).....	40 mg/kg
Zinc (oxyde de zinc 3b603).....	60 mg/kg
Iode (iodate de calcium anhydre 3b202) .....	0.90 mg/kg
Sélénium (sélénite de sodium 3b801) .....	0.16 mg/kg
Cobalt (3b304) .....	0.31 mg/kg

**UFC :** 0.82 **MADC :** 92 g/kg **LYSINE :** 0,51%

Ingrédients : se référer sur les sacs ou bons de livraison



## PROGRAMMES ALIMENTAIRES

Poids du cheval	Quantité à distribuer par jour
250 kg	1,5 à 2,5 kg (3 à 5 litres)
400 kg	2,6 à 4,5 kg (5 à 10 litres)
500 kg	3 à 4,8 kg (6 à 10 litres)
600 kg	3,5 à 5,7 kg (7 à 12 litres)

L'ensemble des rations sont préconisées sur la base d'un apport de foin minimum d'1 kg pour 100 kg de poids vif sur litière paille. Elles sont à moduler en fonction de la qualité et la quantité de fourrages disponibles ainsi que de l'état général et le niveau d'activité du cheval. En cas de litière artificielle, augmentez les apports en foin de 2 à 3 kg supplémentaires par jour. La distribution du nouvel aliment devra s'effectuer de façon progressive grâce à une transition avec le précédent aliment sur 8-10 jours minimum. Rations en 2 ou 3 repas par jour avec eau pure et tempérée à volonté.